DOULEUR ABDOMINALE



MED. 9 Douleur abdominale

Critère d'inclusion :

Douleur sous l'ombilic avec ou sans irradiation dans le dos.

1. **Se référer au protocole d'appréciation de la condition clinique préhospitalière.**
2. **Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis.**
3. **Pour toute douleur entre l'épigastre et le nombril, se référer à MED. 10 (Douleur thoracique) et effectuer un ECG 12 dérivations chez le patient de plus de 18 ans.**
4. **Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/Saturométrie).**
5. **Si tension artérielle systolique < 100 :**

   a) Évaluer la possibilité d'une réaction anaphylactique, si agent causal suspecté ou confirmé, se référer au protocole MED. 17 (Réaction allergique/anaphylactique).

   b) Administrer de l'oxygène avec masque haute concentration à 10 L/min ou plus;

   c) Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique;

   d) Décubitus dorsal si toléré;

   e) Transport **URGENT** au centre désigné par le SPU.

6. **Si douleur au dos ou histoire de syncope :**

   a) Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique;

   b) Si histoire de syncope chez le patient de 18 ans ou plus, effectuer un ECG 12 dérivations;

   c) Transport **URGENT** au centre désigné par le SPU

7. **Transport NON URGENT au centre désigné par le SPU si aucun critère d'instabilité.**
8. **Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux.**