

CLIENTÈLE

Âge ≥ 15 ans

MÉDICATIONS ET THÉRAPIES

Médication en perfusion (protocoles INTER)

- acétylcystéine (NAC) (Mucomyst^{MD})
- amiodarone (Cordarone^{MD})
- antibiotique(s)
- anti-acide
- bicarbonate de sodium
- chlorure de potassium
- eptifibatide (Integrilin^{MD})
- héparine
- nitroglycérine (concentration max. de 400 mcg/ml)
- norépinéphrine (noradrénaline, Levophed^{MD})
(concentration max. de 16 mcg/ml [4 mg dans 250 ml])
- ocréotide (Sandostatin^{MD})
- sulfate de magnésium

Médicaments PRN (protocoles généraux)

- adénosine
- atropine
- dextrose 50% IV et dextrose 10% IV
- fentanyl IV, IM, SC
- midazolam IV, IM, IN
- Médicaments de soins primaires :
 - AAS PO
 - épinéphrine IM
 - glucagon IM/IN
 - nitroglycérine SL
 - salbutamol INH

Autres (protocoles généraux)

- Cardioversion électrique urgente
- Défibrillation manuelle
- Stimulation cardiaque externe
- Soins avancés en réanimation cardiovasculaire (ACLS)
- Accès intraosseux

Éléments non autorisés, escorte médicale requise

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Agent anesthésique • BiPaP • Curare • Drain thoracique | <ul style="list-style-type: none"> • Lunette nasale haut débit • Stimulation cardiaque endoveineuse • Patient intubé | <ul style="list-style-type: none"> • Produits sanguins • Ventilation mécanique • Médicament par voie centrale |
|---|---|--|

ÉQUIPEMENTS

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Moniteur-défibrillateur (avec stimulateur cardiaque externe) | <ul style="list-style-type: none"> • Oxygène | <ul style="list-style-type: none"> • 2 pousses-seringues | <ul style="list-style-type: none"> • 2 pompes volumétriques |
|--|---|---|--|

AUTRES RÉFÉRENCES

Espace partenaires d'Urgences-santé



Guide clinique général
(critères d'inclusion / exclusion complets)

